



NARKOSE BEI KINDERN

EMPFEHLUNGEN DER KLINIK FÜR ANÄSTHESIOLOGIE UND INTENSIVMEDIZIN DER MEDIZINISCHEN HOCHSCHULE HANNOVER

1 Eine Woche vor der Operation: **Trifft eine der folgenden Fragen auf Ihr Kind zu?**

- Zu krank für die Kindertagesstätte?
- Eitriger Schnupfen und/ oder produktiver Husten?
- Fieber über 38,5°C?

Dann ist es sinnvoll den OP-Termin zu verschieben. Bitte kontaktieren Sie uns werktags, zwischen 07:30-16:00 Uhr unter Tel. 0176-1532-2132

2

Nüchternheit vor dem Eingriff. Was ist erlaubt?

- Bis 6 Stunden vorher: Feste Nahrung
- Bis 4 Stunden vorher: Milch
- Bis 3 Stunden vorher: Muttermilch
- Bis 1 Stunde vorher: Klare Flüssigkeit
(z. B. Wasser, Tee oder auch Saft ohne Fruchtstücke)



Bei ambulanten Operationen:

Lassen Sie Ihr Kind vor der Abfahrt in die Klinik noch Wasser oder Tee trinken.

3

Am OP-Tag: Die korrekte Anwendung des EMLA-Pflasters

Wann ist das Pflaster aufzukleben?

➔ Vor der Abfahrt in die Klinik, Pflaster auf die markierte Stelle kleben.

Wann ist das Pflaster zu entfernen?

➔ Bei der Einnahme des Beruhigungsstoffes, spätestens aber vor Abfahrt in den OP-Bereich.

Wo wird das Pflaster aufgeklebt?

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Handrücken (rechts) | <input type="checkbox"/> Handrücken (links) |
| <input type="checkbox"/> Ellenbeuge (rechts) | <input type="checkbox"/> Ellenbeuge (links) |
| <input type="checkbox"/> Alternative Stelle: | |